

150806821

PAPER - 1 : PHYSICS, CHEMISTRY & MATHEMATICS

प्रश्न पुस्तिका - 1 : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Important Instructions :

- Immediately fill in the particulars on this page of the Test Booklet with *Blue/Black Ball Point Pen*. *Use of pencil is strictly prohibited*.
- The Answer Sheet is kept inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of 90 questions. The maximum marks are **360**.
- There are **three** parts in the question paper A, B, C consisting of Physics, Chemistry and Mathematics having 30 questions in each part of equal weightage. Each question is allotted **4 (four)** marks for each correct response.
- Candidates will be awarded marks as stated above in Instruction No. 5 for correct response of each question. $\frac{1}{4}$ (one-fourth) marks will be deducted for indicating incorrect response of each question. No deduction from the total score will be made if no response is indicated for an item in the Answer Sheet.*
- There is only one correct response for each question. Filling up more than one response in each question will be treated as wrong response and marks for wrong response will be deducted accordingly as per instruction 6 above.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/marking responses on *Side-1* and *Side-2* of the Answer Sheet. *Use of pencil is strictly prohibited*.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc., except the Admit Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only. This space is given at the bottom of each page and in 2 pages (Pages 38 – 39) at the end of the booklet.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- The CODE for this Booklet is **M**. Make sure that the CODE printed on *Side-2* of the Answer Sheet is the same as that on this booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

This booklet contains 40 printed pages.
इस पुस्तिका में मुद्रित पृष्ठ 40 हैं।

Test Booklet Code
परीक्षा पुस्तिका संकेत



महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बाल पाइट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर सावधानीपूर्वक विकरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटे है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं। अधिकतम अंक 360 है।
- इस प्रश्न पुस्तिका में तीन भाग A, B, C हैं जिसके प्रत्येक भाग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 4 (चार) अंक निर्धारित किये गये हैं।
- परीक्षार्थीयों को प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए अंक उपरोक्त निर्देश स. 5 में वर्ताए अनुसार दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर को दर्शाने पर अंकों का $\frac{1}{4}$ (एक-चौथाई) भाग कटा जाएगा। यदि प्रश्न का चौर्था उत्तर नहीं दर्शाया गया है तो प्रदल अंकों में से कोई अंक नहीं कटा जाएगा।
- इस उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर है। एक से अधिक उत्तर देने पर उसे गलत उत्तर माना जाएगा और उपरोक्त निर्देश 6 के अनुसार अंक काट लिये जाएंगे।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बाल पाइट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हाँस में प्रवेश कार्ड के अन्तर्वाले किसी भी प्रवर्ष की पादव्य सामग्री, मुद्रित या हस्तालिखित, कागज की पर्शियाँ, पेजर, गोबाइल फोन, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को से जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- एफ कार्ड परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कौजिए। यह जगह प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे की ओर और पुस्तिका के अंत में 2 पृष्ठों (पृष्ठ 38 – 39) पर दी गई है।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हाँस छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- इस पुस्तिका का संकेत **M** है। यह सुनिश्चित बताता है कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर छपे संकेत से मिलता है। अगर यह मिलता है, तो परीक्षार्थी दूसरे परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरन्त अवगत कराएं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capital letters) :

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Roll Number : in figures

<input type="text"/>					
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

अनुक्रमांक : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Examination Centre Number :

परीक्षा केन्द्र क्रमांक

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Name of Examination Centre (in Capital letters) :

परीक्षा केन्द्र का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Downloaded From : <http://www.cbseportal.com>

Candidate's Signature :


Invigilator's Signature :

PART A — PHYSICS

1. The length and width of a rectangular plate are measured to be (15.30 ± 0.05) cm and (12.80 ± 0.05) cm, respectively. The area of the plate and the approximate uncertainty in the calculated area are (in cm^2)

- (1) $195.84 \pm 1.4\%$
- (2) $195.8 \pm 0.7\%$
- (3) $196.0 \pm 0.7\%$
- (4) $196.0 \pm 0.07\%$

2. Which of the following is the correct conclusion from the given displacement – time graph for a particle?




- (1) It represents accelerated motion
- (2) It represents retarded motion
- (3) Finally the particle moves with a constant speed
- (4) Finally the particle moves with a constant acceleration

भाग A — भौतिक विज्ञान

1. एक आयताकार प्लेट की लम्बाई एवं चौड़ाई क्रमशः (15.30 ± 0.05) cm एवं (12.80 ± 0.05) cm मापी जाती हैं। प्लेट का क्षेत्रफल और गणना किए गए क्षेत्रफल में अनिश्चितता (cm^2 में) लगभग है


- (1) $195.84 \pm 1.4\%$
- (2) $195.8 \pm 0.7\%$
- (3) $196.0 \pm 0.7\%$
- (4) $196.0 \pm 0.07\%$

2. एक कण के लिए विस्थापन और समय के इस ग्राफ से निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सही है ?



- (1) यह त्वरित गति दर्शाता है
- (2) यह अवमंदित गति दर्शाता है
- (3) अन्ततः कण एक स्थिर चाल से गति करता है
- (4) अन्ततः कण एक स्थिर त्वरण से गति करता है


3.



Mass $m_1 = 1.5 \text{ kg}$ is moving to the right with speed 4.0 m/s . Mass $m_2 = 2.0 \text{ kg}$ attached with a light spring is moving to the left with speed 2.5 m/s . They move on a frictionless horizontal surface and collide. The spring constant is 600 N/m . What is the compression in the spring at the instant when m_2 is at rest after collision?

- (1) 0.24 m
- (2) 0.20 m
- (3) 0.50 m
- (4) 0.15 m

4. In the figure shown below block A (mass m_A) is pulled on a frictionless surface by a force F so that blocks A and B (mass m_B) move together. If the coefficient of friction between A and B is μ , the correct value of F so that A and B move together is



- (1) $m_A \mu g$
- (2) $m_B \mu g$
- (3) $(m_A + m_B) \mu g$
- (4) $\left(\frac{m_A m_B}{m_A + m_B} \right) \mu g$


3.



द्रव्यमान $m_1 = 1.5 \text{ kg}$ चाल 4.0 m/s से दायीं ओर गति करता है। एक हल्की कमानी से जुड़ा द्रव्यमान $m_2 = 2.0 \text{ kg}$ चाल 2.5 m/s से बायीं ओर गति करता है। वे एक घर्षणहीन क्षेत्र पर गति कर संघट्ठ करते हैं। कमानी स्थिरांक 600 N/m है। जब m_2 संघट्ठ के बाद विराम अवस्था में है, उस क्षण कमानी में संपीड़न क्या है?

- (1) 0.24 m
- (2) 0.20 m
- (3) 0.50 m
- (4) 0.15 m

4. नीचे दर्शाएं चित्र में ब्लॉक A (द्रव्यमान m_A) को बल F द्वारा एक घर्षणहीन पृष्ठ पर इस प्रकार खींचा जाता है कि ब्लॉक A एवं B (द्रव्यमान m_B) दोनों एक साथ गतिशील हैं। यदि A एवं B के बीच घर्षण गुणांक μ है, तब A एवं B के एक साथ गतिशील होने के लिए F का सही मान है



- (1) $m_A \mu g$
- (2) $m_B \mu g$
- (3) $(m_A + m_B) \mu g$
- (4) $\left(\frac{m_A m_B}{m_A + m_B} \right) \mu g$

5. A bullet of mass 5 gm travelling at 40 metres per second passes through a wooden block of thickness 3 cm and comes out with a velocity of 20 metres per second. If the resistance offered by the wooden block is uniform, what thickness of it would be just sufficient to stop the bullet ?

- (1) 5 cm
- (2) 4 cm
- (3) 6 cm
- (4) 8 cm

6. A bicycle wheel of radius R rolls down an inclined plane of height h. If its initial angular speed on top of the plane is ω_0 and there is no slipping, the angular speed at the bottom of the plane is (take the mass of the wheel to be concentrated on the periphery)

$$(1) \sqrt{\frac{2gh}{R^2}} + \omega_0$$

$$(2) \sqrt{\frac{4gh}{R^2}} + \omega_0$$

$$(3) \sqrt{\left(\frac{gh}{R^2} + \omega_0^2\right)}$$

$$(4) \sqrt{\frac{gh}{R^2}} + \omega_0$$

5. 40 मीटर प्रति सेकण्ड की चाल से गतिशील 5 gm द्रव्यमान की एक गोली 3 cm मोटाई के एक लकड़ी के तर्जे से गुजरती है और पार कर 20 मीटर प्रति सेकण्ड के वेग से बाहर निकलती है। यदि लकड़ी के तर्जे द्वारा लगाया गया प्रतिरोध एकसमान है, तब गोली को बस रोकने भर के लिए आवश्यक मोटाई क्या होनी चाहिए ?

- (1) 5 cm
- (2) 4 cm
- (3) 6 cm
- (4) 8 cm

6. विज्या R का एक साइकिल का पहिया ऊँचाई h के एवं आनत तल से नीचे लुढ़कता है। यदि तल के शीर्ष पर इसकी प्रारम्भिक कोणीय चाल ω_0 है और कोई फिसलन नहीं है, तब तल की तली पर कोणीय चाल है (पहिये वे द्रव्यमान को उसकी परिधि पर संकेन्द्रित मान लें)

$$(1) \sqrt{\frac{2gh}{R^2}} + \omega_0$$

$$(2) \sqrt{\frac{4gh}{R^2}} + \omega_0$$


$$(3) \sqrt{\left(\frac{gh}{R^2} + \omega_0^2\right)}$$

$$(4) \sqrt{\frac{gh}{R^2}} + \omega_0$$

7. Four identical bodies of mass m each are placed at the corners of a square of side ' a '. They move in circular orbits about the centre of the square under the gravitational force of each other. The speed v of each body is

- (1) $\sqrt{\frac{Gm}{a}}$
- (2) $\sqrt{\frac{Gm}{(1+\sqrt{2})a}}$
- (3) $\sqrt{\frac{Gm(4+\sqrt{2})}{4a}}$
- (4) $\sqrt{\frac{Gm(2+\sqrt{2})}{2a}}$


8. A container has some amount of ice at 0°C . The container is slowly heated and after some time the ice is fully converted into steam at 100°C . Which one of the following graphs represents the process qualitatively? In each graph X represents heat supplied and Y represents temperature of the material in the container.




7. भुजा 'a' के एक वर्ग के कोनों पर द्रव्यमान m की चार सर्वसम वस्तुएँ रखी हैं। वे एक-दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल के अन्तर्गत वर्ग के केन्द्र पर वृत्तीय अक्ष में गति करती हैं। प्रत्येक वस्तु की चाल v है।

- (1) $\sqrt{\frac{Gm}{a}}$
- (2) $\sqrt{\frac{Gm}{(1+\sqrt{2})a}}$
- (3) $\sqrt{\frac{Gm(4+\sqrt{2})}{4a}}$
- (4) $\sqrt{\frac{Gm(2+\sqrt{2})}{2a}}$

8. एक पात्र में 0°C पर कुछ बर्फ की मात्रा रखी है। पात्र को धीरे-धीरे गर्म किया जाता है और कुछ समय पश्चात् बर्फ पूर्णतः 100°C की वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित ग्राफ में से कौन-सा प्रक्रिया को गुणात्मक रूप से दर्शाता है?
- प्रत्येक ग्राफ में X दी गई ऊष्मा को दर्शाता है और Y पात्र में पदार्थ के तापमान को।




9. The figure shows a water tank. The area of cross-sections of the tank at points A, B, C and D are 0.7 m^2 , 2 cm^2 , 1.5 cm^2 and 2 cm^2 respectively. Find the velocity of water at point D at the time when the height of water is 100 cm above the bottom.
($g = 10 \text{ m/sec}^2$)




- (1) 5 m/s
- (2) 4.83 m/s
- (3) 4.47 m/s
- (4) 4.93 m/s

10. Two identically shaped bodies A and B of masses m_A and m_B and specific heats S_A and S_B , are heated to 90°C and then allowed to cool. Their cooling curves, temperature (θ) vs. time (t) are shown. Then the most correct statement about the bodies is




- (1) $m_A < m_B$
- (2) $S_A > S_B$
- (3) $m_A S_A > m_B S_B$
- (4) $m_A S_A < m_B S_B$

चित्र एक पानी के टैंक को दर्शाता है। बिन्दु A, B, एवं D पर टैंक के अनुप्रस्थ-प्रतिच्छेद क्षेत्रफल क्रम 0.7 m^2 , 2 cm^2 , 1.5 cm^2 एवं 2 cm^2 हैं। जब त से पानी की ऊँचाई 100 cm हो, तब बिन्दु D पर प का वेग ज्ञात कीजिए। ($g = 10 \text{ m/sec}^2$)



- (1) 5 m/s
- (2) 4.83 m/s
- (3) 4.47 m/s
- (4) 4.93 m/s

10. सर्वसम आकार के दो पिंड A एवं B, जिनका द्रव्यमाण m_A एवं m_B और विशिष्ट ऊष्मा S_A एवं S_B हैं, 90°C तापमान तक गर्म करके ठंडा होने दिया जाता है। ठंडे होने के समय में तापमान (θ) के समय (t) के संबंध चित्र में दिखाए गए हैं। तब पिंडों के लिए सही प्रकथन है



- (1) $m_A < m_B$
- (2) $S_A > S_B$
- (3) $m_A S_A > m_B S_B$
- (4) $m_A S_A < m_B S_B$

11. Hydrogen $\left(\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{7}{5}\right)$ is used in a

Carnot cycle as working substance. During adiabatic expansion the volume of the gas increases by a factor of 32. The efficiency of this Carnot engine is

- (1) 0.0002
- (2) 0.25
- (3) 0.75
- (4) 0.9998

12. A thermally insulated massless vessel containing n moles of a gas with molar weight M is moving with uniform speed v . The vessel is stopped suddenly. If the entire kinetic energy of the vessel goes into heating of the gas, the increase in the temperature of the gas is $\left(\gamma = \frac{C_p}{C_v}\right)$

- (1) $\frac{1}{2} n M v^2 \frac{(\gamma - 1)}{R}$
- (2) $\frac{1}{2} n M v^2 \frac{\gamma}{R}$
- (3) $\frac{1}{2} M v^2 \frac{\gamma}{R}$
- (4) $\frac{1}{2} M v^2 \frac{(\gamma - 1)}{R}$

11. कानों चक्र में हाइड्रोजन $\left(\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{7}{5}\right)$ का

कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। रुद्धोष्प्रसार के दौरान गैस का आयतन 32 गुना बढ़ता है। इस कानों इंजन की दक्षता है

- (1) 0.0002
- (2) 0.25
- (3) 0.75
- (4) 0.9998

12. मोलर भार M वाली एक गैस के n मोल से युक्त ऊष्मा अवरोधी द्रव्यमानविहीन बर्तन एकसमान चाल v से गतिशील है। बर्तन को अचानक रोक दिया जाता है। यदि बर्तन की सम्पूर्ण गतिज ऊर्जा गैस को गर्म करने में लग जाए, तब गैस के तापमान में वृद्धि होगी $\left(\gamma = \frac{C_p}{C_v}\right)$

- (1) $\frac{1}{2} n M v^2 \frac{(\gamma - 1)}{R}$
- (2) $\frac{1}{2} n M v^2 \frac{\gamma}{R}$
- (3) $\frac{1}{2} M v^2 \frac{\gamma}{R}$
- (4) $\frac{1}{2} M v^2 \frac{(\gamma - 1)}{R}$

13. A particle is executing simple harmonic motion. The maximum speed of the particle is v_0 . The speed of the particle at the instant when displacement is half of the amplitude is

(1) $\frac{v_0}{2}$

(2) $v_0\sqrt{3}$

(3) $\frac{v_0}{4}$

(4) $v_0 \frac{\sqrt{3}}{2}$

14. Air columns in two open pipes of length L are vibrating simultaneously in fundamental mode. If the length of one of the pipes is reduced by y, then the number of beats heard per second will be, if the velocity of sound is v and $y \ll L$,

(1) $\frac{y v}{2L^2}$

(2) $\frac{y v}{L^2}$

(3) $\frac{y v}{4L^2}$

(4) $\frac{2L^2}{y v}$

13. एक कण सरल आवर्ती गति कर रहा है। कण का अधिकतम चाल v_0 है। जब विस्थापन आयाम का आधार है, तब उस क्षण कण की चाल है

(1) $\frac{v_0}{2}$

(2) $v_0\sqrt{3}$

(3) $\frac{v_0}{4}$

(4) $v_0 \frac{\sqrt{3}}{2}$

14. लम्बाई L के दो खुले पाइपों के बायु स्तम्भ मूल विधि एक साथ कम्पित होते हैं। यदि एक पाइप की लम्बाई y से कमी कर दी जाए, तब प्रति सेकण्ड सुनी विस्पन्दों की संख्या होगी, यदि ध्वनि का वेग v है और $y \ll L$,

(1) $\frac{y v}{2L^2}$

(2) $\frac{y v}{L^2}$

(3) $\frac{y v}{4L^2}$

(4) $\frac{2L^2}{y v}$

- 15.** Two positive charges are fixed on the x-axis at points ($\pm a$). A small charge q is placed at the origin and displaced slightly in the y-direction and released. Then
- if q is positive, it will perform simple harmonic motion
 - if q is negative, it will perform simple harmonic motion
 - if q is negative, it will move farther away from the origin
 - if q is positive, it will move towards the origin and stop there
- 16.** The cross-sectional area of the plates of a parallel plate air capacitor is A and the distance between the plates is d . If V is the potential difference between the plates, the energy per unit volume of the capacitor will be
- $\epsilon_0 \frac{AV^2}{d}$
 - $\epsilon_0 \frac{V^2}{Ad}$
 - $\frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{V^2}{d^2}$
 - $\frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{AV^2}{d}$

where ϵ_0 is the electric permittivity.

15. x-अक्ष के विन्दुओं ($\pm a$) पर दो धनात्मक आवेश रखे जाते हैं। मूल-विन्दु पर एक अत्य आवेश q रखा जाता है और इसे y-दिशा में थोड़ा सा विस्थापित किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। तब

- यदि q धनात्मक है, तब यह सरल आवर्त गति करेगा
- यदि q ऋणात्मक है, तब यह सरल आवर्त गति करेगा
- यदि q ऋणात्मक है, तब यह मूल-विन्दु से और दूर होता चला जाएगा
- यदि q धनात्मक है, तब यह मूल-विन्दु की ओर गति करेगा और वहाँ रुक जाएगा

16. एक समान्तर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं का अनुप्रस्थ-परिच्छेद क्षेत्रफल A है और पट्टिकाओं के बीच दूरी d है। यदि पट्टिकाओं के बीच विभवान्तर V है, तब संधारित्र की प्रति इकाई आयतन ऊर्जा होगी

$$(1) \epsilon_0 \frac{AV^2}{d}$$

$$(2) \epsilon_0 \frac{V^2}{Ad}$$

$$(3) \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{V^2}{d^2}$$



$$(4) \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{AV^2}{d}$$

जहाँ ϵ_0 विद्युतशीलता है।

Page 10

SPACE FOR ROUGH WORK / *तुम यहाँ काम करो*

17. In the circuit given here, $C = 2 \mu F$, $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $E_1 = 12 V$, $E_2 = 16 V$. The charge on the capacitor will be
- (1) $19 \times 10^{-6} C$
 (2) $34 \times 10^{-6} C$
 (3) $29 \times 10^{-6} C$
 (4) $9.5 \times 10^{-6} C$
18. H^+ and He^+ ions of same kinetic energy enter a region of uniform magnetic field and travel in circular paths inside the region. The ratio of the radii $r(H^+) : r(He^+)$ is
- (1) 1 : 1
 (2) 2 : 1
 (3) 1 : 2
 (4) 1 : 4
19. Two identical current carrying rings 'I', and '2', are placed concentrically with their planes at right angles to each other. The current in ring 'I' is twice that flowing in ring '2'. The ratio of magnitude in resultant magnetic field to that due to ring '2', at the common point is
- (1) 3 : 2
 (2) $\sqrt{3} : \sqrt{2}$
 (3) $\sqrt{5} : 2$
 (4) $\sqrt{5} : \sqrt{2}$



20. The ends of the coil of an electromagnet are connected to 220 V, 50 Hz mains. An aluminium ring is suspended near one of the poles.

Statement-1 : The ring will be repelled.

Statement-2 : According to Lenz's law, induced e.m.f. is such that it opposes the change in magnetic flux.

- (1) Statement-1 is true, Statement-2 is false.
- (2) Statement-1 is false, Statement-2 is true.
- (3) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is **not** the correct explanation for Statement-1.
- (4) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is the correct explanation for Statement-1.

21. A transformer steps down 200 V to 20 V to operate a device with an impedance of 200Ω . Then the current drawn from the mains by the primary of the transformer is

- (1) 0.01 A
- (2) 0.02 A
- (3) 0.1 A
- (4) 0.2 A

20. एक विद्युत-चुम्बक की कुण्डली के सिरों को 220 V, 50 Hz में से जोड़ा जाता है। एक ध्रुव के समीप एक ऐलुमिनियम का बलय लटकाया जाता है।

प्रकथन-1 : बलय प्रतिकर्षित होगा।

प्रकथन-2 : लेन्ज के नियम के अनुसार, प्रेरित विद्युत-वाहक बल इस प्रकार है कि यह चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है।

- (1) प्रकथन-1 सत्य है, प्रकथन-2 असत्य है।
- (2) प्रकथन-1 असत्य है, प्रकथन-2 सत्य है।
- (3) प्रकथन-1 सत्य है, प्रकथन-2 सत्य है; प्रकथन-2, प्रकथन-1 की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (4) प्रकथन-1 सत्य है, प्रकथन-2 सत्य है; प्रकथन-2, प्रकथन-1 की सही व्याख्या करता है।

21. एक ट्रांसफॉर्मर 200 V से 20 V अपचायित करता है जिससे कि 200Ω प्रतिबाधा वाली एक युक्ति प्रचालित की जा सके। तब ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक द्वारा मेन से खींची गई धारा है

- (1) 0.01 A
- (2) 0.02 A
- (3) 0.1 A
- (4) 0.2 A

SPACE FOR ROUGH WORK / ~~एक फैले की तरफ पर्याप्त~~

23. A screen is placed at a distance of 1 m from a narrow slit. The slit is illuminated by light of wavelength 5×10^{-5} cm. If the first minima of either side of the central maximum is at a distance of 5 mm from it, the width of the slit is

(1) 0.02 cm , 0.05 cm , 0.1 cm , 0.4 cm

(2) $\text{निम्नलिखित सभी में से}$, $\text{निम्नलिखित सभी में से}$, $\text{निम्नलिखित सभी में से}$, $\text{निम्नलिखित सभी में से}$

(3) $\text{निम्नलिखित सभी में से}$, $\text{निम्नलिखित सभी में से}$, $\text{निम्नलिखित सभी में से}$, $\text{निम्नलिखित सभी में से}$

(4) $\text{निम्नलिखित सभी में से}$, $\text{निम्नलिखित सभी में से}$, $\text{निम्नलिखित सभी में से}$, $\text{निम्नलिखित सभी में से}$

(1) Statement-1 is true, Statement-2 is true.

(2) Statement-1 is true, Statement-2 is not the correct explanation for Statement-1.

(3) Statement-1 is true, Statement-2 is false.

(4) Statement-1 is false, Statement-2 is not the correct explanation for Statement-1.

Statement-2 : α -particles come out of the nucleus whereas β -particles are electrons coming out from different shells of an atom. Depending on which shell the electrons come from, their energies are different.

Statement-2 : α -particles come out of the

nucleus whereas β -particles are emitted with fixed energy while β -particles have a range of energy.

Statement-1 : In the detection of α -radiation, it is found that

α -particle is found to have a range of 10^{-2} to 10^{-3} cm.

$$(4) 3 F m_e$$

$$(3) \frac{F}{3m_e}$$

$$(2) \frac{3F}{m_e}$$

$$(1) \frac{F}{m_e}$$

25. A particle is moving three times as fast as an electron. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is C. If the mass of the electron is m_e , the mass of the particle is

$$(4) 3 F m_e$$

$$(3) \frac{F}{3m_e}$$

$$(2) \frac{m_e}{3F}$$

$$(1) \frac{3}{F m_e}$$

कल अनुचित लेखन को बहाना नहीं करें। यहाँ पर अनुचित लेखन को बहाना नहीं करें।

25.

$$(4) \frac{m_e}{4\lambda}$$

$$(3) \frac{m_e}{2\lambda}$$

$$(2) \frac{\lambda}{4m_e^2}$$

$$(1) \frac{\lambda}{2m_e^2}$$

यहाँ पर अनुचित लेखन को बहाना नहीं करें। यहाँ पर अनुचित लेखन को बहाना नहीं करें।

$$(4) \frac{\lambda}{4\lambda} = \frac{1}{4}$$

$$(3) \frac{\lambda}{2\lambda} = \frac{1}{2}$$

$$(2) \frac{\lambda}{4m_e^2} = \frac{1}{4m_e^2}$$

$$(1) \frac{\lambda}{2m_e^2} = \frac{1}{2m_e^2}$$

the rays interfere constructively is given by the minimum "t" for which rays interfere. The minimum "t" for which surfaces of the layer and the two reflected partly reflected at the upper and lower air is incident normally on the layer. It is $t = 1.8$. Light of wavelength λ , travelling in

M/Page 14

SPACE FOR ROUGH WORK / *यह इन्हें लिखे दें*

The operation of the transistor as a switch is carried out in region(s)

The graph shows a plot of output voltage V_o (y-axis) against input voltage V_i (x-axis). The curve is divided into three distinct regions labeled a, b, and c. Region a is at low V_i where $V_o \approx V_i$. Region b is a narrow transition region where the voltage drops sharply. Region c is at high V_i where $V_o \approx 0$.

26. *कौन सी कथन यहाँ लिखें ?*
atoms and ions. Then which of the following statements is correct ?

(1) *कौन सी कथन यहाँ लिखें ?*
and $n = 1$ orbit of He^+ is same.

(2) Acceleration of electron in $n = 2$ orbit of He^+ is same.
 $n = 1$ orbit of He^+ is same.

(3) Speed of electron in $n = 1$ orbit of He^+ is same.
 $n = 1$ orbit of He^+ is same.

(4) Speed of electron in $n = 2$ orbit of He^+ is same.
 $n = 1$ orbit of He^+ is same.

27. *कौन सी कथन यहाँ लिखें ?*
A nucleus X_m^n emits an α -particle and three β -particles. The final nucleus will be

(1) Y_m^n
 $n = 4$ and $n = 1$ orbit of He^+ is same.

(2) Z_m^{n+1}
 $n = 2$ and $n = 1$ orbit of He^+ is same.

(3) Y_m^{n-2}
 $n = 1$ and $n = 2$ orbit of He^+ is same.

(4) X_m^{n-5}
 $n = 4$ and $n = 1$ orbit of He^+ is same.

28. *कौन सी कथन यहाँ लिखें ?*
Figure shows characteristic of a base biased transistor in CE configuration. In the plot of output voltage (V_o) vs. the input voltage (V_i), three regions a, b, c are marked.

The graph shows a plot of output voltage V_o (y-axis) against input voltage V_i (x-axis). The curve is divided into three distinct regions labeled a, b, and c. Region a is at low V_i where $V_o \approx V_i$. Region b is a narrow transition region where the voltage drops sharply. Region c is at high V_i where $V_o \approx 0$.

(1) a and b
is carried out in region(s)

(2) a and c
The operation of the transistor as a switch

(3) b and c
is carried out in region(s)

(4) b only
The operation of the transistor as a switch

29. Statement-1 : For a given modulation frequency (FM) the AM signal has a wider bandwidth than the FM signal. Statement-2 : FM signal has a larger amplitude modulated (AM) wave.
- (1) *જ્ઞાન-1 ઠીક હૈ, જ્ઞાન-2 ઠીક હૈ*
જ્ઞાન-1 પરિસરમાં જ્ઞાન-2 પરિસર હૈ
- (2) *જ્ઞાન-1 ઠીક હૈ, જ્ઞાન-2 ઠીક હૈ, જ્ઞાન-2,*
જ્ઞાન-1 પરિસરમાં જ્ઞાન-2 પરિસર હૈ
- (3) *જ્ઞાન-1 ઠીક હૈ, જ્ઞાન-2 ઠીક હૈ, જ્ઞાન-2,*
જ્ઞાન-1 પરિસરમાં જ્ઞાન-2 પરિસર હૈ
- (4) *જ્ઞાન-1 ઠીક હૈ, જ્ઞાન-2 ઠીક હૈ*
30. A travelling microscope is used to measure the length of very small objects
- (1) measure the length of very small objects
જ્ઞાન-1 પરિસરમાં જ્ઞાન-2 પરિસર હૈ
- (2) measure the angle of prism
જ્ઞાન-2 પરિસરમાં જ્ઞાન-1 હૈ
- (3) measure the circumference of very small objects
જ્ઞાન-1 પરિસરમાં જ્ઞાન-2 પરિસર હૈ
- (4) measure the angle of diffraction of the light by a small aperture
જ્ઞાન-2 પરિસરમાં જ્ઞાન-1 હૈ

SPACE FOR ROUGH WORK / ~~the unit cell formula~~

31. The number of moles of $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ to be added to 0.10 L of a solution that is 1.0 M in KCl so that it 1.0 M, if $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ will completely precipitate PbCl_2 is
- 0.15 mol
 - 0.20 mol
 - 0.20 L
 - 0.45 L
32. An electric spark is passed through NH_3 gas kept in a container of 1 L capacity at 1 atm pressure and 25°C. Had there been complete dissociation of NH_3 gas into its gaseous constituents (N_2 and H_2), the number of moles of N_2 and H_2 formed respectively would have been
- 2.0435×10^{-3} and 6.1305×10^{-3}
 - 2.0435×10^{-2} and 6.1305×10^{-2}
 - 2.0435×10^{-3} and 6.1305×10^{-3}
 - 2.0435×10^{-3} and 6.1305×10^{-2}
33. Iron(II) oxide, FeO , has a cubic structure and each edge of the unit cell is 5.0 Å. If the density of the oxide is 4.0 g cm^{-3} , the number of Fe^{2+} and O^{2-} ions present in each unit cell will be
- 1 Fe^{2+} and 1 O^{2-}
 - 3 Fe^{2+} and 3 O^{2-}
 - 4 Fe^{2+} and 4 O^{2-}
 - 6 Fe^{2+} and 3 O^{2-}
- ($\text{Molar mass of FeO} = 72 \text{ u}$)
34. FeO has a cubic structure and each edge of the unit cell is 5.0 Å. If the density of the oxide is 4.0 g cm^{-3} , the number of Fe^{2+} and O^{2-} ions present in each unit cell will be
- 1 Fe^{2+} and 1 O^{2-}
 - 3 Fe^{2+} and 3 O^{2-}
 - 4 Fe^{2+} and 4 O^{2-}
 - 6 Fe^{2+} and 3 O^{2-}

- 34.** Electrons are ejected from a clean metal by making use of the principles of photoelectric effect. The condition that must be satisfied is
- the metal should be at a low temperature,
 - the metal should be at a high temperature
 - the kinetic energy of photons striking the surface must be equal to that of the ejected electrons
 - the kinetic energy of photons striking the surface must be equal to that of the ejected electrons plus the binding energy with which the electron is held by the metal
- 35.** Consider the following species :
- CN^- , NO^+ , O_2^- and O_2^{2-}
- The pair of these species having identical bond order is
- CN^- and O_2^-
 - NO^+ and O_2^{2-}
 - CN^- and NO^+
 - CN^- and O_2^{2-}
- 34.** प्रकाश-विद्युत् प्रभाव के सिद्धान्तों के अनुसार एक स्वच्छ धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। वह शर्त जिसका पालन होना चाहिए, है
- धातु को निम्न ताप पर होना चाहिए
 - धातु को उच्च ताप पर होना चाहिए
 - धातु की सतह पर चोट करने वाले फ़ोटॉनों की गतिज ऊर्जा, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए
 - धातु की सतह पर चोट करने वाले फ़ोटॉनों की गतिज ऊर्जा, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तथा आबन्ध ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन धातु से बँधे हैं, के योगफल के बराबर होनी चाहिए
- 35.** निम्न स्पीशीज़ पर विचार कीजिए :
- CN^- , NO^+ , O_2^- तथा O_2^{2-}
- इन स्पीशीज़ का कौन-सा जोड़ा एक जैसा आबन्ध क्रम वाला है ?
- CN^- तथा O_2^-
 - NO^+ तथा O_2^{2-}
 - CN^- तथा NO^+
 - CN^- तथा O_2^{2-}

SPACE FOR ROUGH WORK / यहाँ से टेक्स करें

<p>36. In an adiabatic process, there is no exchange of heat between system and surroundings. For a free expansion of an ideal gas under adiabatic condition, the correct option is</p> <p>(1) $q = 0, \Delta T \neq 0, W = 0$ (2) $q \neq 0, \Delta T = 0, W = 0$ (3) $q = 0, \Delta T = 0, W = 0$ (4) $q = 0, \Delta T > 0, W \neq 0$</p>	<p>37. In the following reversible reaction,</p> <p>$A \rightleftharpoons yB$</p> <p>if M is the initial molecular mass and m is the molecular mass of A at equilibrium, the degree of dissociation (x) of A is given as,</p> <p>(1) $\frac{M - m}{M}$ (2) $\frac{(y - 1)m}{M - m}$ (3) $\frac{(1 - y)M}{m - M}$ (4) $\frac{(y - 1)M}{m - M}$</p>
---	--

M/Page 19

SPACE FOR ROUGH WORK / ~~यह इनके लिए उपयोग करें।~~

<p>38. The equilibrium constants for the reactions इनका सम्पूर्ण विवरण।</p> $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2 NO(g)$ $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2 NO_2(g)$	<p>are K_1 and K_2 respectively. The equilibrium constant (K_3) for the reaction,</p> $N_2(g) + 2 O_2(g) \rightleftharpoons 2 NO_2(g)$ <p>$N_2(g) + 2 O_2(g) \rightleftharpoons 2 NO(g)$ will be</p> <p>(1) K_1/K_2</p> <p>(2) $K_1 K_2$</p> <p>(3) $K_1^2 K_2^2$</p> <p>(4) $K_1^2 K_2$</p>
<p>39. $Ca(OH)_2$ का नियन्त्रण अवधि $3.0 \times 10^{-6} M$ वाली</p>	<p>buffer solution of $pH = 8$ में वाली $Ca(OH)_2$ की सल्बिलिटी $3.0 \times 10^{-6} M$ है। $pH = 8$ का नियन्त्रण अवधि $Ca(OH)_2$ की buffer solution of $pH = 8$ है।</p> <p>(1) $1.08 \times 10^{-10} M$</p> <p>(2) $1.08 \times 10^{-12} M$</p> <p>(3) $1.08 \times 10^{-4} M$</p> <p>(4) $1.08 \times 10^{-6} M$</p>
<p>40. $0.1 M Sn^{2+}$ की 100 cm^3 की Sn^{4+} की अवधि</p>	<p>उचित अवधि Sn^{4+}, 50 cm^3 की $0.40 M Ce^{4+}$ solution was titrated with 50 cm^3 Sn^{4+} की अवधि तक तिराहा गया। तिराहा गया तक अवधि अवधि Sn^{4+} की अवधि ज्ञात करें।</p> <p>(1) $+ 2$</p> <p>(2) $+ 3$</p> <p>(3) $+ 1$</p> <p>(4) $+ 4$</p>


41. For a first-order reaction at 37°C , the concentration of the reactant is reduced to one-half of its initial value after 1000 s. The time required for concentration to be reduced to one-quarter of its initial value at 37°C is nearly
 એ-એટે કે કાર્બન એ 1 37°C એ એ એ, એ એ-એટે કે, એ એ-એટે
 એ-એટે કે 1000 સ એ એ એ એ એ એ-એટે એ એ એ-એટે એ એ-એટે
 એ-એટે એ 37°C એ એ એ, એ એ-એટે એ એ-એટે એ એ-એટે
42. Amongst the following, the largest protecting power is of
 એ-એટે એ એ-એટે એ એ-એટે એ એ-એટે એ એ-એટે
 (1) 500 s
 (2) 2000 s
 (3) 3000 s
 (4) 4000 s
 એ-એટે એ 37°C એ એ-એટે એ એ-એટે એ એ-એટે
43. Which of the following elements would have the highest ionization enthalpy?
 એ-એટે એ એ-એટે એ એ-એટે એ એ-એટે એ એ-એટે
 (1) [Ne] $3s^2$
 (2) [Ne] $3s^2 3p^1$
 (3) [Ne] $3s^2 3p^2$
 (4) [Ne] $3s^2 3p^3$
 એ-એટે એ 43.
44. Which of the following reactions is an example for calcination process?
 એ-એટે એ એ-એટે એ એ-એટે એ એ-એટે એ એ-એટે
 (1) $2 \text{Zn} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ZnO}$
 (2) $2 \text{ZnS} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ZnO} + 2 \text{SO}_2$
 (3) $\text{MgCO}_3 \xrightarrow{\hspace{2cm}} \text{MgO} + \text{CO}_2$
 (4) $2 \text{Ag} + 2 \text{HCl} + [\text{O}] \leftrightarrow 2 \text{AgCl} + \text{H}_2\text{O}$
 એ-એટે એ 44.

SPACE FOR ROUGH WORK / *અનુભૂતિ કરવાની જગત*

<p>48. When MnO_2 is fused with KOH in the presence of oxygen, a coloured compound is formed. The compound and its colour are</p>	<p>(1) K_2MnO_4, purple green (2) KMnO_4, purple (3) Mn_2O_3, yellow (4) Mn_3O_4, black</p>
<p>47. Which one of the following oxides undergoes dimerization on decreasing the temperature?</p>	<p>(1) CO_2 (2) NO_2 (3) SO_2 (4) ClO_2</p>
<p>46. Anhydrous magnesium chloride can be prepared by heating $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ with concentrated hydrochloric acid</p>	<p>(1) in an atmosphere of dry hydrogen gas (2) in an atmosphere of dry nitrogen gas (3) in a current of dry HCl gas (4) in an atmosphere of dry H_2</p>
<p>45. $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ is heated to form a white solid which is</p>	<p>(1) NaHCO_3 (2) MgSO_4 (3) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ (4) CaSO_4</p>
<p>44. NaHCO_3 is used to remove</p>	<p>(1) MnO_2, black (2) Mn_3O_4, brown (3) Mn_2O_3, yellow (4) Mn_3O_4, black</p>

49. Which of the following complexes will show the highest molar conductance ? $(1 \times 10^{-3} M)$ aqueous solution is used in each case for the measurements)
- (1) ~~$\text{Na}_4\text{H}_4\text{O}_4\text{Cr}_2\text{O}_7\text{N}_3\text{-Na}_4\text{AlO}_2\text{(III)}$~~ sodium hexanitrito-N-cobaltate(III)
- (2) ~~$\text{K}_4\text{H}_4\text{O}_4\text{PtCl}_6\text{(IV)}$~~ hexammineplatinum(IV) bromide
- (3) ~~$[\text{Fe}(\text{en})_3]^{\text{II}}\text{NO}_3\text{-Fe}^{\text{II}}\text{Cl}_2$~~ tri(ethylenediamine)nickel(II) nitrate
- (4) ~~$\text{K}_4\text{H}_4\text{O}_4\text{Cr}_2\text{O}_7\text{(III)}$~~ potassium tetrachloro(ethylenediamine) chromate(III)
50. An important product in the ozone depletion by chlorofluorocarbons is
- (1) OF_2
- (2) O_2F_2
- (3) OCl
- (4) Cl_2
51. The blue or green colour formed in Lasagna's test for nitrogen is due to
- (1) $\text{Fe}_4^{\text{II}}[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$
- (2) $\text{Fe}_3^{\text{II}}[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$
- (3) $\text{Fe}_4^{\text{II}}[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$
- (4) $\text{Fe}_3^{\text{II}}[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$


52. The structure







shows

- (1) Geometrical Isomerism
- (2) Optical Isomerism
- (3) Geometrical and Optical Isomerism
- (4) Tautomerism


53. Complete the reaction :



Product is




52. निम्न संरचना







दर्शाती है

- (1) ज्यामितीय समावयवता
- (2) प्रकाशिक समावयवता
- (3) ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता
- (4) चलावयवता

53. अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए :



उत्पाद है



54. Which one of the following is the product of reaction of 3,3,3-trifluoropropene and hydrochloric acid ?
- (1) $\text{CF}_3\text{CHCl} - \text{CH}_3$
 - (2) $\text{CF}_2 = \text{C} = \text{CH}_2$
 - (3) $\text{CF}_3\text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{Cl}$
 - (4) $\text{CF}_3\text{C} = \text{CH}$
55. The base strength of the following ~~से जुड़े हैं~~ is in the order of
- (1) $\text{Cl}_3\text{COO}^- > \text{Cl}_2\text{CHCOO}^- >$
 - (2) $\text{CH}_3\text{COO}^- > \text{ClCH}_2\text{COO}^- >$
 - (3) $\text{Cl}_3\text{COO}^- > \text{CH}_3\text{COO}^- >$
 - (4) $\text{Cl}_2\text{CHCOO}^- > \text{Cl}_3\text{COO}^-$
56. What product is expected from the reaction of phosgene (COCl_2) and excess of diethylamine ?
- (1) $\text{Et}_2\text{N}-\text{COOEt}$
 - (2) $\text{Et}_2\text{N}-\text{S}(=\text{O})\text{Et}$
 - (3) $\text{Et}_2\text{N}-\text{C}(=\text{O})\text{NEt}_2$
 - (4) $\text{Et}_2\text{N}-\text{S}(=\text{S})\text{NEt}_2$

- | | |
|--|---|
| <p>57. Which one of the following is an example of copolymerization ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Polystyrene Polythene Bakelite Natural Rubber <p>58. The enzyme which hydrolyses triglycerides to fatty acid and glycerol, is</p> <ol style="list-style-type: none"> Pepsin Maltase Zymase Lipase <p>59. Chloromycetin, known also as Chloramphenicol, is effective in the treatment of</p> <ol style="list-style-type: none"> AIDS Malaria Tuberculosis Typhoid <p>60. Which of the following pairs of radicals gives yellow precipitate with a mixture of ammonium molybdate and conc. HNO_3 ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Cu^{2+}, BO_3^{3-} As^{3+}, PO_4^{3-} Ca^{2+}, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ Cr^{3+}, NO_3^- | <p>57. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सहबहुलकीकरण का उदाहरण है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> पॉलीस्टाइरीन पॉलीथीन बेकेलाइट प्राकृतिक रबर <p>58. ट्राइग्लिसराइड को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में अपघटन करने वाला एन्जाइम है</p> <ol style="list-style-type: none"> पेप्सिन माल्टेज़ ज्यायमेज़ लाइफॉइंड <p>59. क्लोरोमाइसेटिन, जो क्लोरैम्फेनिकॉल के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किसके उपचार में प्रभावशाली है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> एड्स (AIDS) मलेरिया तपेदिक टाइफॉइड <p>60. निम्नलिखित में से कौन-सा मूलक युग्म अमोनियम मोलिब्डेट एवं सांद्र HNO_3 के मिश्रण के साथ पीला अवक्षेप देता है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Cu^{2+}, BO_3^{3-} As^{3+}, PO_4^{3-} Ca^{2+}, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ Cr^{3+}, NO_3^- |
|--|---|

M/Page 26

SPACE FOR ROUGH WORK / ~~ટ્રાન્ઝ અને ફેન્ટે ટ્રાન્ઝ~~

$$(4) \frac{bc}{a^2} = \frac{pq}{(p-q)^2}$$

$$(3) \frac{bc}{a^2} = \frac{pq}{(p+q)^2}$$

$$(2) \frac{ab}{c^2} = \frac{pq}{(p-q)^2}$$

$$(1) \frac{bc}{b^2} = \frac{pq}{(p+q)^2}$$

63. If, for non-zero real numbers a, b, c , the roots of the equation $ax^2 + bx + c = 0$ are in the ratio $p : q$, then

$$(4) \frac{1}{3}$$

$$(3) \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$(2) 3$$

$$(1) \sqrt{3}$$

in complex plane, intersect is

curves $\arg(z) = \frac{\pi}{6}$ and $|z - 2\sqrt{3}i| = p$

62. The least value of p for which the two

curves $\arg(z) = \frac{\pi}{6}$ and $|z - 2\sqrt{3}i| = p$

intersect each other in the first quadrant is

$$(4) 2$$

$$(3) 1$$

$$(2) -1$$

$$(1) -2$$

then the value of k is

61. If the function $f : R \rightarrow R$, defined by

$f(x) = 1 + kx$, $k \neq 0$, is its own inverse,

then k is

61. If the function $f : R \rightarrow R$, defined by

$f(x) = 1 + kx$, $k \neq 0$, is its own inverse,

then k is

Downloaded From : <http://www.cbseportal.com>

64. Consider the systems of linear equations :

$$\begin{aligned} A : \quad & 4x - 6y + 2z = 4 \\ & 2x - 4y + 8z = 3 \\ & -6x + 2y + 4z = -5 \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} B : \quad & 2x - 3y + z = 2 \\ & x - 2y + 4z = 4 \\ & -3x + y + 2z = -3 \end{aligned}$$

Then

- (1) A has no unique solution and B has a unique solution
- (2) Both A and B have unique solutions
- (3) A has a unique solution and B has no unique solution
- (4) Both A and B have no unique solution

65. Given A and B are two 3×3 matrices.

Statement-1 : $AB - BA$ is a skew-symmetric matrix, when both A and B are symmetric.

Statement-2 : $AB - BA$ is a skew-symmetric matrix, when both A and B are skew-symmetric.

- (1) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
- (2) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is *not* a correct explanation for Statement-1.
- (3) Statement-1 is true, Statement-2 is false.
- (4) Statement-1 is false, Statement-2 is true.

64. निम्न ऐतिक समीकरणों के निकायों पर विचार कीजिए :

$$\begin{aligned} A : \quad & 4x - 6y + 2z = 4 \\ & 2x - 4y + 8z = 3 \\ & -6x + 2y + 4z = -5 \end{aligned}$$

तथा

$$\begin{aligned} B : \quad & 2x - 3y + z = 2 \\ & x - 2y + 4z = 4 \\ & -3x + y + 2z = -3 \end{aligned}$$

तो

- (1) A का कोई एकमात्र हल नहीं है तथा B का एकमात्र हल है
- (2) A तथा B दोनों के एकमात्र हल हैं
- (3) A का एकमात्र हल है तथा B का एकमात्र हल नहीं है
- (4) A तथा B दोनों के एकमात्र हल नहीं हैं

65. A तथा B दिए गए दो 3×3 आव्यूह हैं।

कथन-1 : जब A तथा B दोनों सममित आव्यूह हैं, तब $AB - BA$ एक विषम-सममित आव्यूह है।

कथन-2 : जब A तथा B दोनों विषम-सममित आव्यूह हैं, तो $AB - BA$ एक विषम-सममित आव्यूह है।

- (1) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है; कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या है।
- (2) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है; कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।
- (4) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।

$$(4) \quad 2x - 3y + 9 = 0$$

$$(3) \quad \frac{3}{x} + \frac{2}{y} = 1$$

$$(2) \quad \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$$

$$(1) \quad 2x + 3y = 9$$

$$(4) \quad 2x - 3y + 9 = 0$$

$$(3) \quad \frac{3}{x} + \frac{2}{y} = 1$$

$$(2) \quad \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$$

$$(1) \quad 2x + 3y = 9$$

where it crosses the y-axis is

$$y = 3e^{-x/2}$$

72. The equation of the tangent to the curve

(4) यात्रा-1 सत्य है, यात्रा-2 भवित है।

(3) यात्रा-1 भवित है, यात्रा-2 सत्य है।

(2) यात्रा-1 भवित है, यात्रा-2 भवित है; यात्रा-2, यात्रा-1 भवित नहीं है।

(1) यात्रा-1 भवित है, यात्रा-2 भवित है; यात्रा-2, यात्रा-1 भवित नहीं है।

(4) Statement-1 is false, Statement-2 is true.

false.

(3) Statement-1 is true, Statement-2 is

true; Statement-2 is not a correct explanation for Statement-1.

(2) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is not a correct explanation for Statement-1.

(1) Statement-1 is true, Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.

continuous.

Statement-2 : $f(x) = x | x |$ is differentiable and its derivative is

71. Statement-1 : $g(x) = 2|x|$ is continuous.

73. The volume and radius of the base of a right circular cone are decreasing at a uniform rate of $2 \text{ cm}^3/\text{s}$ and 1 cm/s , respectively, while its height is increasing at a uniform rate of 3 cm/s . When the radius of its base is 2 cm , its height (in cm) will be

(1) $\frac{2\pi + 1}{\pi}$

(2) $\frac{2\pi - 1}{\pi}$

(3) $\frac{6\pi + 3}{2\pi}$

(4) $\frac{6\pi - 3}{2\pi}$

74. If $y = y(x)$ is the solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y-1)}$, $y(0) = -1$, then $y(1)$ is equal to

(1) 4

(2) 2

(3) -2

(4) -4

73. एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन तथा इसके आधार की विज्या क्रमशः 2 घन सेमी/से. तथा 1 सेमी/से. की एकसमान दर से घट रहे हैं, जबकि इसकी ऊँचाई 3 सेमी/से. की एकसमान दर से बढ़ रही है। जब इसके आधार की विज्या 2 सेमी है, तब इसकी ऊँचाई (सेमी में) होगी

(1) $\frac{2\pi + 1}{\pi}$

(2) $\frac{2\pi - 1}{\pi}$

(3) $\frac{6\pi + 3}{2\pi}$

(4) $\frac{6\pi - 3}{2\pi}$

74. यदि $y = y(x)$ अवकल समीकरण

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y-1)}, \quad y(0) = -1 \text{ का हल है,}$$

तो $y(1)$ बराबर है

(1) 4

(2) 2

(3) -2

(4) -4

<p>75. $\int \frac{(1+\sqrt{x})\sqrt{x-x^2}}{x} dx$ is equal to</p>	<p>(1) $\frac{1-\sqrt{x}}{2\sqrt{x-x^2}} + k$ (2) $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x-1}} + k$ (3) $\frac{2(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{1-x}} + k$ (4) $\frac{\sqrt{1-2x}}{(\sqrt{x}-1)^2} + k$ </p>
<p>76. Statement-I : $F(x) = \int_x^0 \ln\left(\frac{\sqrt{2+y}}{\sqrt{2-y}}\right) dy$</p>	<p>Statement-II : If $f(y)$ is an even function $x < \sqrt{2}$ then $F(x)$ is an even function</p>
<p>76. Statement-I : $F(x) = \int_x^0 \ln\left(\frac{\sqrt{2+y}}{\sqrt{2-y}}\right) dy$</p>	<p>is an even function for $x < \sqrt{2}$.</p>
<p>76. Statement-II : If $f(y)$ is an even function $x < \sqrt{2}$ then $\Phi(x) = \int_x^a f(y) dy$ is an even function.</p>	<p>(1) Statement-I is true, Statement-II is correct explanation for Statement-I. (2) Statement-I is true, Statement-II is not a correct explanation for Statement-II.</p>
<p>77. $\Phi(x) = \int_x^a f(y) dy$ is an even function $x < \sqrt{2}$ then $\Phi(x)$ is an even function.</p>	<p>(1) Statement-1 is true, Statement-2 is correct explanation for Statement-1. (2) Statement-1 is true, Statement-2 is not a correct explanation for Statement-1. (3) Statement-1 is true, Statement-2 is false. (4) Statement-1 is false, Statement-2 is true.</p>

77. If $2 f(x) - f\left(\frac{1}{x}\right) = \ln x^3$ ($x > 0$), then the area of the region, in sq. units, bounded by $f(e^x)$, the axis of x and the lines $x = 1$, $x = 2$ is
- 2
 - $\frac{3}{2}$
 - 1
 - $\frac{1}{2}$

78. Statement-1 : If $\cos^2 x = \sin 2x$,
 $x \neq (2n + 1) \frac{\pi}{2}$,
 n is an integer, then
 $\sin 2x + \cos 2x = \frac{1}{5}$.

Statement-2 : $\sin 2x + \cos 2x = \frac{2 - (\tan x - 1)^2}{1 + \tan^2 x}$.

- Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
- Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is **not** a correct explanation for Statement-1.
- Statement-1 is true, Statement-2 is false.
- Statement-1 is false, Statement-2 is true.

77. यदि $2 f(x) - f\left(\frac{1}{x}\right) = \ln x^3$ ($x > 0$) है, तो $f(e^x)$, x -अक्ष तथा रेखाओं $x = 1$, $x = 2$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) है
- 2
 - $\frac{3}{2}$
 - 1
 - $\frac{1}{2}$

78. कथन-1 : यदि $\cos^2 x = \sin 2x$,
 $x \neq (2n + 1) \frac{\pi}{2}$,
 n एक पूर्णांक है, तो
 $\sin 2x + \cos 2x = \frac{1}{5}$ है।

कथन-2 : $\sin 2x + \cos 2x = \frac{2 - (\tan x - 1)^2}{1 + \tan^2 x}$.

- कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है; कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या है।
- कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है; कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है।
- कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।
- कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।

SPACE FOR ROUGH WORK / *यह इसके लिए उपयोग करें।*

85. If the variance of the curved surface areas of 5 circular cones each with slant height 7 cm and radii 1, 2, 3, 4, 5 cm respectively, is $72\pi^2 \text{ cm}^2$, then ℓ (in cm) is equal to
- (1) 5 (2) 6 (3) 8 (4) 9
86. Equation of an ellipse is $x^2 + 3y^2 = 6$. Statement-1 : Eccentricity of the ellipse is $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Statement-2 : Length of latus rectum = $\frac{1}{3}$ (major axis).
- (1) Statement-1 is true, Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
 (2) Statement-1 is true, Statement-2 is not a correct explanation for Statement-1.
 (3) Statement-1 is true, Statement-2 is a correct explanation for Statement-2.
 (4) Statement-1 is false, Statement-2 is true.
87. If ℓ_1 and ℓ_2 are the focal distances of a point P from the two directrices of an ellipse, then $\ell_1 + \ell_2$ is equal to
- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4) 3
88. If ℓ_1 and ℓ_2 are the focal distances of a point P from the two directrices of an ellipse, then $\ell_1 - \ell_2$ is equal to
- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4) 3
89. If ℓ_1 and ℓ_2 are the focal distances of a point P from the two directrices of an ellipse, then $\ell_1^2 - \ell_2^2$ is equal to
- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4) 3
90. If ℓ_1 and ℓ_2 are the focal distances of a point P from the two directrices of an ellipse, then $\ell_1^2 + \ell_2^2$ is equal to
- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4) 3
91. If ℓ_1 and ℓ_2 are the focal distances of a point P from the two directrices of an ellipse, then $\ell_1^3 - \ell_2^3$ is equal to
- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4) 3
92. If ℓ_1 and ℓ_2 are the focal distances of a point P from the two directrices of an ellipse, then $\ell_1^3 + \ell_2^3$ is equal to
- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4) 3
93. If ℓ_1 and ℓ_2 are the focal distances of a point P from the two directrices of an ellipse, then $\ell_1^4 - \ell_2^4$ is equal to
- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4) 3
94. If ℓ_1 and ℓ_2 are the focal distances of a point P from the two directrices of an ellipse, then $\ell_1^4 + \ell_2^4$ is equal to
- (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4) 3
95. If the area of the sector of a circle of radius 5 cm is 5π sq cm, then the angle of the sector is
- (1) 36° (2) 45° (3) 60° (4) 72°
96. If the area of the sector of a circle of radius 5 cm is 5π sq cm, then the angle of the sector is
- (1) 36° (2) 45° (3) 60° (4) 72°

87. The equation of the common tangent line to the curves $y = x^2$ and $xy = 1$ is
 (1) $x - 4y - 4 = 0$
 (2) $4x - y - 4 = 0$
 (3) $x + 4y + 4 = 0$
 (4) $4x + y + 4 = 0$
88. If the co-ordinates of the extremities of a diameter of a circle are $(-1, 1)$ and $(5, -7)$, then the length of the chord intercepted by the circle on the line $3x - 4y + 2 = 0$ is
 (1) 3
 (2) 4
 (3) 5
 (4) 6
89. All possible values of c so that the two lines $x - y = 2$ and $cx + y = 3$ intersect in the first quadrant, lie in the interval
 (1) $\left(-2, \frac{1}{2}\right]$
 (2) $[-3, 1)$
 (3) $\left(-1, \frac{3}{2}\right]$
 (4) $\left[-\frac{1}{2}, 1\right)$
90. Let the lines $y + x = 0$ and $y = 3x$ intersect the line $x = 3$ at A and B respectively. If the bisector of the obtuse angle between the first two lines meets the third line at C, then C divides AB in the ratio
 (1) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$
 (2) $1 : \sqrt{3}$
 (3) $1 : \sqrt{5}$
 (4) $\sqrt{2} : \sqrt{5}$
87. वक्रों $y = x^2$ तथा $xy = 1$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण है
 (1) $x - 4y - 4 = 0$
 (2) $4x - y - 4 = 0$
 (3) $x + 4y + 4 = 0$
 (4) $4x + y + 4 = 0$
88. यदि एक वृत्त के एक व्यास के अंत बिन्दुओं के निरेशांक $(-1, 1)$ तथा $(5, -7)$ हैं, तो वृत्त द्वारा रेखा $3x - 4y + 2 = 0$ पर काटी गई जीवा की लंबाई है
 (1) 3
 (2) 4
 (3) 5
 (4) 6
89. c के वह सभी संभावित मान, जिनके लिए दो रेखाएँ $x - y = 2$ तथा $cx + y = 3$, प्रथम चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करती हैं, निम्न अंतराल में हैं
 (1) $\left(-2, \frac{1}{2}\right]$
 (2) $[-3, 1)$
 (3) $\left(-1, \frac{3}{2}\right]$
 (4) $\left[-\frac{1}{2}, 1\right)$
90. माना रेखाएँ $y + x = 0$ तथा $y = 3x$, रेखा $x = 3$ को क्रमशः A तथा B पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पहली दो रेखाओं के बीच के अधिक कोण का समद्विभाजक तीसरी रेखा को C पर मिलता है, तो C, AB को जिस अनुपात में बाँटता है, वह है
 (1) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$
 (2) $1 : \sqrt{3}$
 (3) $1 : \sqrt{5}$
 (4) $\sqrt{2} : \sqrt{5}$